

KLACID®
CLARITHROMYCINUM

Terapeitiskās indikācijas ietver:[1-5]

- apakšējo elpceļu infekcijas
- augšējo elpceļu infekcijas
- ādas un mīksto audu infekcijas
- akūtu vidusauss iekaisumu
- *H. pylori* izskaušanai pacientiem ar divpadsmitpirkstu zarnas čūlu[2,3]

Jāņem vērā oficiālās vadlīnijas par atbilstošu antibakteriālo līdzekļu lietošanu.[1-5]

Atsauces:
1. Klacid® 125 mg/5 ml granulas iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit
2. Klacid® 250 mg apvalkotās tabletes zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit
3. Klacid® 500 mg apvalkotās tabletes zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit
4. Klacid® SR 500 mg ilgstošās darbības tabletes zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit
5. Klacid® i.v.500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit

VIATRIS

Recepšu zāles. Reklāmas devējs: Viatris SIA. Reklāmas saskaņošanas numurs: LA-KLA-2026-00001. Reklāmas saskaņošanas datums: 2026.gada februāris.

KLACID®
CLARITHROMYCINUM


Klaritromicīns - 4 dažādās zāļu formās[1]

Apvalkotās tabletes

250 mg N10




500 mg N14




Granulas iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

125 mg/ 5 ml 100ml




Modificētās ilgstošās darbības tablete

500 mg N5



500 mg N7



Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai


500 mg 15 ml



Atsauce:
1. Zāļu valts aģentūra, Latvijas zāļu reģistrs, www.zva.gov.lv

VIATRIS

Recepšu zāles. Reklāmas devējs: Viatris SIA. Reklāmas saskaņošanas numurs: LA-KLA-2026-00001. Reklāmas saskaņošanas datums: 2026.gada februāris.



KLACID®
CLARITHROMYCINUM

Tablešu devas[1-3]


	Klacid®250 mg, 500 mg (klaritromicīns)		Klacid®SR 500 mg (klaritromicīns)	
	Diennakts deva	**Ārstēšanas ilgums**	**Diennakts deva**	**Ārstēšanas ilgums**
Parastā ieteicamā deva pieaugušajiem un bērniem no 12 g.v.	**2 x 250 mg**	**7 dienas**	**1 x 500 mg kopā ar ēdienu**	**5 – 14 dienas**
Smagu infekciju ārstēšana pieaugušajiem un bērniem no 12 g.v.	**2 x 500 mg**	**līdz 14 dienām**	**1 x 1000 mg kopā ar ēdienu**	**5 – 14 dienas**

Tabletes nedrīkst dalīt uz pusēm.[2]

Atsauces:
1. Klacid® 250 mg apvalkotās tabletes zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit
2. Klacid® 500 mg apvalkotās tabletes zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit
3. Klacid® SR 500 mg ilgstošās darbības tabletes zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit

VIATRIS

Recepšu zāles. Reklāmas devējs: Viatris SIA. Reklāmas saskaņošanas numurs: LA-KLA-2026-00001. Reklāmas saskaņošanas datums: 2026.gada februāris.



KLACID®
CLARITHROMYCINUM

Suspensijas devas[1]

Vecums		Zīdaiņi atbilstoši ķermeņa masai	1 – 2 gadi	3 – 6 gadi	7 – 9 gadi	10 – 12 gadi
Ķermeņa masa* (kg)		Līdz 8 kg	8 – 11 kg	12 – 19 kg	20 – 29 kg	30 – 40 kg
Deva	RĪTS	7,5 mg/kg	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml
	VAKARS	7,5 mg/kg	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml

GATAVO SUSPENSIJU:

- Var lietot atsevišķi vai kopā ar maltīti
- Var lietot kopā ar pienu
- Pagatavotu suspensiju jāizlieto 14 dienu laikā



ar augļu garšu

VIATRIS

Atsauce:
1. Klacid® 125 mg/5 ml granulas iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit

Recepšu zāles. Reklāmas devējs: Viatris SIA. Reklāmas saskaņošanas numurs: LA-KLA-2026-00001. Reklāmas saskaņošanas datums: 2026.gada februāris.

KLACID®
CLARITHROMYCINUM

Intravenozai ievadīšanai[1]

Klacid® i.v.500 mg,pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

1. Sākotnējā šķīduma pagatavošana

Pievienojiet 10 ml STERILA ŪDENS INJEKCIJĀM pulverim, kas atrodas 500 mg flakonā.

Izmantojiet tikai sterilu ūdeni injekcijām, jo citi šķīdinātāji var izraisīt izgulsnēšanos šķīdināšanas laikā.

NEIZMANTOJIET ŠĶĪDINĀTĀJUS, KAS SATUR KONSERVANTUS VAI NEORGANISKUS SĀĻUS!



2. Sākotnējā šķīduma sagatavošana ievadīšanai

Pievienot vismaz 250 ml vienā no turpmāk norādītajiem šķīdumiem:

5% glikozes šķīdums Ringera-Laktāta šķīdumā, 5% glikozes šķīdums, Ringera-Laktāta šķīdums, 5% glikozes šķīdums 0,3% nātrija hlorīda šķīdumā, Normosol-M 5% glikozes šķīdumā, Normosol-R 5% glikozes šķīdumā, 5% glikozes šķīdums 0,45% nātrija hlorīda šķīdumā un 0,9% nātrija hlorīda šķīdums.

IEVADĪT LĒNI 60 MINŪŠU LAIKĀ TIKAI INTRAVENOZI!

Klacid® i.v. 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Klacid i.v. ir indicēts gadījumos, kad pret klaritromicīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu infekciju ārstēšanai tālāk minētajos apstākļos ir nepieciešama parenterāla terapija:

- dziļo elpceļu infekcijas, piemēram, akūts un hronisks bronhīts un pneimonija;
- augšējo elpceļu infekcijas, piemēram, sinusīts un faringīts;
- ādas un mīksto audu infekcijas;
- diseminētas vai lokalizētas mikobaktēriju Mycobacterium avium vai Mycobacterium intracellulare izraisītas infekcijas. Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum vai Mycobacterium kansasii izraisītas lokalizētas infekcijas.

Atsauce:

1. Klacid® i.v.500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai zāļu apraksts saskaņots ZVA. Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit

VIATRIS

Recepšu zāles. Reklāmas devējs: Viatris SIA. Reklāmas saskaņošanas numurs: LA-KLA-2026-00001. Reklāmas saskaņošanas datums: 2026.gada februāris.