



EZICLEN®


koncentrāts iekšķīgi lietojama
šķīduma pagatavošanai

Bezūdens nātrija sulfāts, magnija sulfāta heptahidrāts un kālija sulfāts



Lietojams pieaugušajiem zarnu trakta tīrīšanai pirms endoskopiskās vai radioloģiskās izmeklēšanas, kā arī pirms ķirurģiskām procedūrām. Receptu zāles.

Lietošanas shēma īsumā:



Eziclen lietošanas shēmas piemērs.

Sāciet lietot zāles ārsta noteiktajā laikā.

18:00 → **19:00**

0,5 l

Pudelītes saturu ieliet mērglāzē un līdz norādītajai līnijai pieliet ūdeni. Nesteidzīgi (1 stundas laikā) izdzert visu šķīdumu (0,5 l).

19:00 → **20:00**

0,5 + 0,5 l

Nesteidzīgi (1 stundas laikā) izdzert 1 l ūdens vai cita dzirdra šķīduma. Var dzert ar ūdeni, minerālūdeni, tēju, buljonu, dzidru sulu vai limonādi (var dzert gāzētus dzērienus, kā arī dzērienus ar saldinātājiem). **Nedrīkst dzert pienu, nedzirdus dzērienus, sarkanas vai citas spilgtas krāsas dzērienus, alkoholiskos dzērienus, dzērienus ar augļu mīkstumam vai nosēdumiem.**



To pašu atkārtot ar zāļu otro pudelīti **plkst. 20:00-22:00** vai nākamās dienas rītā **plkst. 06:00-08:00**, ja tiek lietots divu dienu režīmā. Medikamenta un papildu šķīduma lietošana ir jāpabeidz: ja netiks pielietota anestēzija – ne mazāk kā vienu stundu pirms procedūras; ja tiks pielietota anestēzija – 2 stundas pirms procedūras, ievērojot anesteziologa norādījumus.

Eziclen koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
(Natrii sulfas anhydricus, Magnesii sulfas heptahydricus, Kalii sulfas)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MAYOLY PHARMA FRANCE, 3 Place Renault 92500 Rueil-Malmaison, Francija.
Papildu informāciju var saņemt no reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvja Medinfo.BAL@mayoly.com



Receptu zāles. Pilnu zāļu aprakstu skatīt, skenējot kvadrāt kodu.
Reklāmas devējs: Mayoly Baltics.
Sagatavots: 10.2025. EZI-LV-2025-0007.

REKOMENDĀCIJAS PIRMS ZARNU TRAKTA TĪRĪŠANAS

Ja izmeklējums ir paredzēts no plkst. 8 līdz 12.

Dienas līdz izmeklējumam		
7 dienas līdz izmeklējumam	Nelietot riekstus un produktus, kuros ir sēklas. Vēlams pārstāt dzert asinis šķidrinošas zāles (<i>konsultēties ar ģimenes ārstu</i>). Ēst, kā parasti, lietot vairāk šķidruma.	 
1 diena līdz izmeklējumam	Var ēst vieglas brokastis (<i>piem., vārītu olu, baltmaizes šķēli, jogurtu bez piedevām</i>). Daudz dzert dzidrus dzērienus (<i>ūdeni, tēju, ābolu sulu</i>). Zarnu traktu tīrošās zāles sākt dzert ne agrāk kā plkst. 17*.	 
Izmeklējuma diena	Nedrīkst ēst/dzert.	

Ja izmeklējums paredzēts pulksten 12 vai vēlāk

Dienas līdz izmeklējumam		
7 dienas līdz izmeklējumam	Nelietot riekstus un produktus, kuros ir sēklas. Vēlams pārstāt dzert asinis šķidrinošas zāles (<i>konsultēties ar ģimenes ārstu</i>). Ēst, kā ierasts, lietot vairāk šķidruma.	 
1 diena līdz izmeklējumam	Var ēst vieglas brokastis (<i>piem., vārītu olu, baltmaizes šķēli, jogurtu bez piedevām</i>). Daudz dzert dzidrus dzērienus (<i>ūdeni, tēju, ābolu sulu</i>). Plkst. 19* izdzert zarnu traktu tīrošo zāļu 1. daļu.	 
Izmeklējuma diena	No rīta pulksten 6*: Izdzert 2. daļu zarnu traktu tīrošo zāļu. Ēst nedrīkst.	

*Sāciet lietot zāles ārsta noteiktajā laikā.

Lielāko daļu ikdienā lietojamo zāļu (*piem., prehipertensijas*) izmeklējuma dienā dzeramas kā parasti, uzdzerot minimālu daudzumu (*malku*) ūdens.

Ja izmeklējums plānots vispārējā anestēzijā (*narkozē*), ir jāierodas kopā ar pavadošo personu, kas pavadīs Jūs mājās.

Pēc izmeklējuma visu atlikušo dienu nav ieteicams vadīt automašīnu, strādāt ar mehānismiem un strādāt augstumā.